



Какви са страничните ефекти от използването на ваксини срещу новия грип А /H1N1/?

Ваксината срещу новия грип, която се прилага в САЩ е в две разновидности като начин на приложение: инжекционно приложение и приложение през носа.

Специалистите са стигнали до някои изводи, относно двете разновидности на използване.

Ваксина срещу грип А/H1N1/, приложена инжекционно, може да даде определени странични ефекти.

За кратък период от време ваксината срещу новия грип може да даде следните странични ефекти:

- Главоболие
- Умора, няколко дни след прилагането ѝ
- Треска

- Болки в мускулите
- Гадене
- Зачервяване, подуване, възпаление или чувствителност, близо до мястото на инжектиране
- Припадък /главно тийнейджъри/

Какви са страничните ефекти при прилагане на ваксината за грип А /H1N1/ през носа?

Страничните ефекти са различни в зависимост от възрастта на пациентите.

Деца от 2 до 17 година са споделили за следните леки симптоми, които са получили след прилагането на ваксината:

- Кашлица
- Главоболие
- Треска
- Мускулни болки
- Назална конгестия
- Хрема
- Болки в стомаха
- Повръщане/диария
- Хрипове

Пациенти на възраст между 18 и 49 годи са посочили някои от следните симптоми:

Кашлица

- Студени тръпки
- Главоболие
- Умора/слабост

Ваксината, поставяна през носа не се препоръчва за всички и не е била одобрена за бременни жени, докато хората между 2 и 49 години са били посочени като подходящи за този вид ваксина.