Описание на фебрилни гърчове при дете

Това са гърчове, свързани с повишаване на температурата. Те са случайна и честа проява в ранната детска възраст и най-често настъпват между шестмесечна и шестгодишна възраст.

Причини за фебрилни гърчове

Обуславят се от дразнещото действие на внезапно повишилата се температура. При тях не се установяват забележими увреждания на нервната система. Обикновено се наблюдават при честите в детската възраст инфекции на гърлото и дихателните пътища.

Симптоми при фебрилни гърчове

Фебрилните гърчове се появяват най-често в първите 10-20 часа от повишаването на температурата, която обикновено е доста висока. За една до три минути детето загубва съзнание и получава гърчове в мускулите на ръцете, краката и лицето, които наподобяват епилепсия. След гърча (който обикновено преминава бързо) не остават никакви последици, детето идва в съзнание и има нормално поведение. Понякога гърчовете могат да се повтарят при всяко следващо заболяване, което се придружава с повишена температура.

Профилактика на фебрилни гърчове

При такива деца е оправдано (по съвет на лекаря) при всяко повишаване на температурата да се дават едновременно противотемпературни лекарства (ацетизал, амидофен) и медикаменти, предпазващи от появата на фебрилен гърч.

Прогноза при фебрилни гърчове

Прогнозата на фебрилните гърчове в болшинството случаи е благоприятна.
Най-важното в тези случаи е лекуването на основното заболяване, което поражда повишаването на температурата.