Какво представлява Западнонилската треска?

Заболяването Западнонилската треска започва остро с втрисане, висока температура, гадене, повръщане, които не могат да бъдат различени от всяка друга остра вирусна инфекция, но много бързо се развива клинична картина на остър енцефалит и менингит, поради което болните се нуждаят от хоспитализация.

Какви са причините за Западнонилската треска?

Ухапване от комар, причинява западнонилския треска.

Какъв е инкубационният период на Западнонилската треска?

Инкубационният период на Западнонилската треска е от 1-6 дни до 14 дни.

Симптоми на Западнонилска треска

· Повечето хора, които са заразени (повечето деца) са асимптоматични или имат симптоми на повръщане и диария.

· Неспецифични симптоми могат да включват: болки в гърлото, болки в гърба, миалгия, артралгия .

· Повечето пациенти със Западнонилски енцефалит развиват енцефалит или асептичен менингит (менингоенцефалит), или и двете.

· Налице е фебрилно състояние, придружено от главоболие, психическо объркване, тремор, или парализа.

Симптомите са най-изявени при много млади и при много възрастни хора.

Физически симптоми

- Повечето пациенти са фебрилни и имат треска.
- Пациентите, които са развили енцефалит имат умствени смущения или дезориентация и може да са с намалено съзнание.

Пациенти с тежки случаи на Западнонилски енцефалит може да са със ступор или кома.

- Десет процента от пациентите с Западнонилски енцефалит имат увеличен черен дроб. Приблизително 20% от тях имат спленомегалия.

- При някои случаи може да се наблюдава фарингит.
- Приблизително 20% от пациентите, заразени с вируса на Западнонилския енцефалит, имат макулопапуларен обрив.
- Генерализирана аденопатия и разширения субментален възел не са често срещани при Западнонилския енцефалит.

Кои са рисковите групи при Западнонилската треска? Възрастните хора над 70 години са най-застрашени при Западнонилската треска.